

EMBARGADO HASTA EL JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021, 10:00 AM HORA DE NUEVA YORK, 14:00 GMT, 16:00 CET

HOJA INFORMATIVA 2021

Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA para 2021

ESTADÍSTICAS MUNDIALES SOBRE EL VIH

37,6 millones [30,2 millones–45,0 millones] de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020.

1,5 millón [1,1 millón–2,1 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2020.

690 000 [480 000–1 millón] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en 2020.

27,4 millones [26,5 millones–27,7 millones] de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en 2020.

77,5 millones [54,6 millones–110 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.

34,7 millones [26,0 millones–45,8 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

Personas que viven con el VIH

- En 2020, 37,6 millones [30,2 millones–45,0 millones] de personas vivían con el VIH.
 - 35,9 millones [28,9 millones–43,0 millones] adultos.
 - 1,7 millón [1,2 millón–2,2 millones] niños (hasta 14 años).
- 84% [68– >98%] de todas las personas que vivían con el VIH conocían su estado serológico con respecto al VIH en 2020.
- Alrededor de 6,0 millones [4,8 millones–7,1 millones] de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH en 2020.

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral

- Al cierre de diciembre de 2020, 27,4 millones [26,5 millones–27,7 millones] de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, en comparación con los 7,8 millones [6,9 millones–7,9 millones] en 2010.
- En 2020, 73% [57–88%] de todas las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento.
 - El 74% [57–90%] de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, así como el 53% [37–68%] de los niños de hasta 14 años.

- El 79% [61– >98%] de las mujeres adultas mayores de 15 años tuvieron acceso al tratamiento; sin embargo, solo el 68% [52-83%] de los hombres adultos de 15 o más años lo tuvieron.
- En 2020, el 84% [63– >98%] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH a sus hijos.

Nuevas infecciones por el VIH

- Desde el pico alcanzado en 1998, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 47%.
 - En 2020, se produjeron 1,5 millón [1,1 millón–2,1 millones] de nuevas infecciones por el VIH, en comparación con los 2,8 millones [2,0 millones–3,9 millones] de 1998.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH descendieron alrededor de un 30%, desde 2,1 millones [1,5 millón–2,9 millones] hasta 1,5 millón [1,1 millón–2,1 millones] en 2020.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 52%, desde 320 000 [210 000–500 000] en 2010 hasta 160 000 [100 000–240 000] en 2020.

Muertes relacionadas con el SIDA

- Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el SIDA se han reducido en más de un 61%.
 - En 2020, alrededor de 690 000 [480 000–1 millón] personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, frente a los 1,8 millón [1,2 millón–2,6 millones] de 2004 y los 1,2 millón [840 000–1,8 millón] de 2010.
- La mortalidad por el SIDA ha disminuido un 42% desde 2010.

Mujeres

- Cada semana, alrededor de 5000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH.
 - En África subsahariana, seis de cada siete nuevas infecciones en adolescentes de entre 15 y 19 años afectan a niñas. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los hombres.
- Más de un tercio (35 %) de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja o violencia sexual fuera de la pareja en algún momento de su vida.
 - En algunas regiones, la probabilidad de contraer la infección por el VIH es 1,5 vez mayor en el caso de mujeres que han sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja con respecto a aquellas que no han sufrido ese tipo de violencia.

- Las mujeres y las niñas representaron aproximadamente el 50% del total de nuevas infecciones por el VIH en 2020. En África subsahariana, las mujeres y las niñas representaron el 63% del total de nuevas infecciones por el VIH.

90–90–90

- En 2020, el 84% [68– >98%] de personas que vivían con el VIH conocían su estado.
- Entre las personas que conocían su estado, el 87% [67– >98%] tenían acceso al tratamiento.
- Y, entre las personas que tenían acceso al tratamiento, el 90% [70– >98%] habían logrado la supresión viral.
- De toda la gente que vive con el VIH, el 84% [68– >98%] conocían su estado, el 73% [57–88%] tenían acceso al tratamiento y el 66% [53–79%] tenían una carga viral indetectable, en 2020.

Datos mundiales sobre el VIH (millones)

	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personas que viven con el VIH	24,2 [19,5–29]	27,4 [22,1–32,9]	30,4 [24,4–36,4]	34,2 [27,5–41]	35 [28,1–41,9]	35,7 [28,7–42,7]	36,4 [29,2–43,5]	37 [29,7–44,3]	37,6 [30,2–45]
Nuevas infecciones por el VIH (total)	2,8 [1,9–3,8]	2,4 [1,7–3,3]	2,1 [1,5–2,9]	1,8 [1,3–2,5]	1,8 [1,3–2,4]	1,7 [1,2–2,3]	1,6 [1,1–2,2]	1,6 [1,1–2,2]	1,5 [1,1–2,1]
Nuevas infecciones por el VIH (mayores de 15 años)	2,3 [1,6–3,1]	1,9 [1,4–2,7]	1,8 [1,3–2,5]	1,6 [1,1–2,3]	1,6 [1,1–2,2]	1,5 [1,1–2,1]	1,5 [1–2]	1,4 [0,99–1,9]	1,3 [0,94–1,8]
Nuevas infecciones por el VIH (hasta 14 años)	0,51 [0,33–0,79]	0,47 [0,31–0,73]	0,32 [0,21–0,5]	0,19 [0,13–0,3]	0,19 [0,12–0,29]	0,18 [0,12–0,28]	0,17 [0,11–0,26]	0,16 [0,1–0,25]	0,16 [0,1–0,24]
Muertes relacionadas con el SIDA	1,4 [0,99–2,1]	1,8 [1,2–2,6]	1,2 [0,84–1,8]	0,87 [0,6–1,3]	0,83 [0,57–1,2]	0,79 [0,54–1,2]	0,75 [0,52–1,1]	0,71 [0,49–1,1]	0,69 [0,48–1]
Personas con acceso a la terapia antirretroviral	0,56 [0,56–0,56]	2 [2–2]	7,8 [6,9–7,9]	17,1 [14,6–17,3]	19,3 [16,6–19,5]	21,5 [19,6–21,7]	23,2 [21,9–23,4]	25,4 [24,5–25,7]	27,4 [26,5–27,7]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021.

Datos regionales —2020

Región	Personas que viven con el VIH 2020	Nuevas infecciones por el VIH 2020			Muertes relacionadas con el SIDA 2020	Personas con acceso a la terapia antirretroviral 2020
		Total	Más de 15 años	Hasta 14 años		
África Oriental y Meridional	20,6 millones [16,8 millones– 24,4 millones]	670 000 [470 000– 930 000]	600 000 [410 000– 830 000]	75 000 [490 00– 130 000]	310 000 [220 000– 470 000]	16 millones [15,4 millones– 16,1 millones]
Asia y el Pacífico	5,7 millones [4,3 millones– 6,8 millones]	280 000 [200 000– 360 000]	270 000 [190 000– 350 000]	13 000 [9200– 18 000]	140 000 [830 00– 220 000]	3,6 millones [3,5 millones– 3,6 millones]
África Occidental y Central	4,7 millones [3,9 millones– 5,8 millones]	200 000 [130 000– 330 000]	150 000 [87 000– 250 000]	55000 [35 000– 82 000]	150 000 [100 000– 210 000]	3,5 millones [3,3 millones – 3,5 millones]
América Latina	2,1 millones [1,4 millón– 2,7 millones]	110 000 [68 000– 150 000]	100 000 [65 000– 140 000]	4600 [2600– 6600]	32 000 [20 000– 46 000]	1,4 millón [1,3 millón– 1,4 millón]
El Caribe	330 000 [280 000– 390 000]	13 000 [8700– 18 000]	12 000 [7800– 17 000]	1200 [750– 1800]	6000 [4300– 8500]	220 000 [210 000– 220 000]
Oriente Medio y África Septentrional	230 000 [190 000– 310 000]	16000 [12 000– 28 000]	15000 [11 000– 26 000]	1400 [1100– 2100]	7900 [6000– 13 000]	93 000 [89 000– 94 000]
Europa Oriental y Asia Central	1,6 millón [1,5 millón– 1,8 millón]	140 000 [120 000– 160 000]	130 000 [110 000– 150 000]	... [...–...]	35 000 [28 000– 43 000]	870 000 [830 000– 870 000]
Europa Occidental y Central, y América del Norte	2,2 millones [1,9 millón– 2,6 millones]	67 000 [53 000– 81 000]	66 000 [53 000– 80 000]	... [...–...]	13 000 [9200– 17 000]	1,9 millón [1,8 millones– 1,9 millón]
Totales mundiales	37,6 millones [30,2 millones– 45,0 millones]	1,5 millón [1,1 millón– 2,1 millones]	1,3 millón [940 000– 1,8 millón]	160 000 [100 000– 240 000]	690 000 [480 000– 1,0 millón]	27,4 millones [26,5 millones– 27,7 millones]

* Las estimaciones relativas a los niños no están publicadas dado que las cifras son bajas.

Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021.

Cobertura del tratamiento por regiones—2020

Región	Porcentaje de mujeres embarazadas con acceso a medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión maternoinfantil del VIH	Porcentaje de adultos (mayores de 15 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral	Porcentaje de niños (hasta los 14 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral	Porcentaje de personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral (total)
África Oriental y Meridional	95% [71– >98%]	78% [62–94%]	57% [39–71%]	77% [60–92%]
Asia y el Pacífico	62% [47–77%]	64% [46–78%]	71% [46–91%]	64% [46–78%]
África Occidental y Central	56% [42–72%]	77% [61–95%]	35% [25–47%]	73% [58–90%]
América Latina	35% [23–46%]	65% [43–86%]	50% [32–73%]	65% [43–86%]
El Caribe	72% [58–87%]	67% [56–80%]	43% [32–54%]	67% [55–79%]
Oriente Medio y África Septentrional	25% [20–33%]	41% [33–57%]	48% [37–62%]	41% [34–57%]
Europa Oriental y Asia Central	... [...–...]	52% [45–59%]	... [...–...]	53% [46–60%]
Europa Occidental y Central, y América del Norte	... [...–...]	83% [68–97%]	... [...–...]	83% [68–97%]
Totales mundiales	84% [63– >98%]	74% [57–90%]	53% [37–68%]	73% [57–88%]

* Las estimaciones relativas a los niños no están publicadas dado que las cifras son bajas.

Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021.

Contacto

Comunicaciones y Advocacy Mundial | +41 22 791 4237 | communications@unaids.org

Las estimaciones de ONUSIDA para 2020 y otros datos adicionales están disponibles en: aidsinfo.unaids.org. Las estimaciones finales de ONUSIDA para 2021 se publicarán en julio de 2021.